

PROTOCOLE ORTHO-K

1^{er} RENDEZ-VOUS

DÉTERMINER LES LENTILLES D'ESSAI

1. Topographie :

Tutoriel « réussir ses topographies » sur les sites
www.lentilledenuit.com ou www.precilens.com

- Instiller 1 à 2 gouttes de solution de confort (AQUADROP+) afin de garantir un ménisque de larmes régulier
- Demander au patient de cligner 2-3 fois puis **d'ouvrir bien grand les yeux** pour avoir une surface de mesure maximale
- **Vérifier la reproductibilité des topographies** en faisant **4 prises par oeil** et en comparant les mesures avec la kératométrie donnée par un auto-réfracteur

2. Réfraction subjective précise

3. Mesure du diamètre cornéen

4. Validation des indications :

Pas de contre-indication | Réfraction dans les limites de fabrication
Diamètre pupillaire < 4mm chez les adultes | Motivation du porteur

2^{ème} RENDEZ-VOUS

CONTRÔLE DE L'IMAGE FLUO et MANIPULATION

1. Contrôler l'image fluo : voir au verso

2. Valider la manipulation :

Tutoriel de manipulation sur les sites
www.lentilledenuit.com ou www.precilens.com



RENDEZ-VOUS DE SUIVI

Après la 1^{ère} nuit

Le matin

À 10 nuits

Fin de journée

À 1 mois

Fin de journée

À 1 an

Fin de journée



Le porteur doit venir avec ses lentilles dans l'étui.

1. Bilan porteur : ressenti subjectif du porteur par rapport au traitement et à ses effets

2. Réfraction complémentaire (sans auto-réfractomètre)

3. Topographies

4. Contrôle de l'intégralité cornéenne à la lampe à fente

5. Images fluo : voir au verso

5. Validation de la manipulation et de l'observance :

- Pose : lentille **remplie** de solution de confort AQUADROP+ **sans conservateur**, miroir à plat sur une table
- Retrait : instiller 2 gouttes d'AQUADROP+ le matin au réveil, puis patienter 15 minutes avant de retirer les lentilles
- Entretien : massage + oxydant (OXYClean) quotidien + déprotéinisation (ProCare) hebdomadaire














IMAGES FLUO DRL CHEZ LE MYOPE




Tutoriel « réussir ses images fluo » consultable sur les sites www.lentilledenuit.com ou www.precilens.com

• Contrôle de l'image fluo avant la 1^{ère} nuit





- Instiller la fluorescéine à l'intérieur de la lentille avant la pose
- Faire poser la lentille avec un miroir à plat sur la table

3 minutes les yeux fermés	Filtre jaune 	1 minute les yeux ouverts en clignant normalement	Lentille centrée sans interaction des paupières
	Sans  Avec   	À l'ouverture  1 mn après   	

Validation de la fluo centrale chez le myope

	Alignée		Serrée
			Plate

Validation de la fluo périphérique

Alignée	Plate	Serrée	Contrôle dans les 2 méridiens
			

Assistance Technique :
Tel : 01 45 13 18 49 - Email : technique@precilens.com